

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

201603

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

201603

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

201603

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルを服用されている方へ

K. C. L.® (10^W/v%) エリキシルは、体内でカリウムイオンとして生理活性を示すほか、カリウムの不足を補給するお薬です。

服用するときは、多量の水（10～20 倍量の水）で薄めて服用してください。

薄めずにそのまま服用すると胃腸障害を起こすおそれがあります。腹痛、嘔気、消化管出血等が現れた場合は服用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。

Ⓜ 丸石製薬株式会社

201603