第2類医薬品

次亜塩素酸ナトリウム製剤

ミルクポン 希釈表

効能・効果	用法・用量	濃度	希釈倍数	全量1L調製	
				ミルクポン（1w/v%）必要量	希釈水
哺乳びん・乳首の殺菌消毒	哺乳びん・乳首を洗った後、本品の80倍液に1時間以上浸す。	0.0125%（125ppm）	80倍	12.5mL	987.5mL
医療器具の消毒、器具・物品などの消毒	本品の20～50倍液に数分間浸すか、清拭する。	0.02～0.05%（200～500ppm）	50倍	20mL	980mL
			20倍	50mL	950mL
室内・便所・浴室の消毒	本品の20 ～ 50倍液で清拭する。	0.02～0.05%（200～500ppm）	50倍	20mL	980mL
			20倍	50mL	950mL
排泄物の消毒	本品の1 ～ 10倍液を用いる。	0.1～1%（1000～10000ppm）	10倍	100mL	900mL
			1倍（原液）	1000mL	（希釈しない）

【用法及び用量に関連する注意】（抜粋）

- 定められた用法・用量を厳守してください。（排泄物の消毒時以外は、原液での使用をさけてください。また、熱湯での希釈はさけてください。）
- 哺乳びん等に付着したミルク等の有機物は、消毒前に十分に洗い落としてからミルクポン溶液につけてください。
- 調製後、ミルクポン溶液が変色した場合、その水での調製をさけてください。

詳細は製品容器の表示をご参照ください。

製造販売元（文献請求先及び問い合わせ先を含む）
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

〔製品情報お問い合わせ先〕
学術情報部 TEL：0120-014-561
〔販売情報提供活動に関するご意見〕
kantokubumon@maruishi-pharm.co.jp

提　携
ピジョン株式会社

2026年9月改訂

「ミルクポン」はピジョン（株）の登録商標（日本国内）です。