

メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」

を使用される方へ

監修：渡部 一宏 先生 （昭和薬科大学 臨床薬学研究センター 実践薬学部門 教授）

メトロニダゾールゲルのほたらき

患部が細菌に感染して膿んでしまっているため、抗菌作用のあるメトロニダゾールゲルを使用します。細菌を壊したり、増殖を抑えることで、患部の臭気の軽減が期待できます。

次の方は、この薬を使用することはできません。

- 過去にこの薬に含まれる成分でアレルギーを経験したことがある方
- 脳や脊髄に器質的な疾患のある方（脳・脊髄のがんは除く）
- 妊娠3ヵ月以内の方

【授乳中の方へ】

授乳されている方は使用しないでください。

やむを得ずこの薬を使用される場合は、授乳しないことが望ましいです。

皮膚潰瘍部位の洗浄は毎日してください。

流水と泡立てた弱酸性せっけんで丁寧に・やさしく全体を洗浄し、分泌液や壊死組織等を除去しましょう。

※ 洗浄時に痛みがある場合は、生理食塩水を使用してください。

薬の使い方

① 1日1～2回ご使用ください。

② 処置前に手を洗います。決められた量の薬をガーゼ等に置き、薬をのばすためのへらもしくは棒*等で患部と同じ大きさになるようにのばします。 * 料理用 木製スティック 等

※ 薬の適正量は医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

※ 薬はガーゼ等の端まで塗らないようにしてください。

③ 薬を塗ったガーゼ等を患部に貼り、テープで固定します。

※ 薬を塗ったガーゼを患部へ「置くイメージ」で貼り、強く擦りこまないでください。（出血などの原因になります）

※ 皮膚のかぶれを防ぐために、同じ部位にテープを固定しないように工夫してください。

※ 浸出液対策としてはガーゼ等の上から吸収性の高いパッドで被覆してください。

※ 浸出液が多い場合は、パッドだけをこまめに交換してください。



参考情報

■ 浸出液対策のパッド（代替品含む）

- ・ 専用のパッド
- ・ 母乳パッド
- ・ 尿取りパッド
- ・ 生理用ナプキン
- ・ 紙おむつ 等

■ テープ以外の固定方法

- ・ カットイングチューブ



患部に②を置く



テープで固定



パッドで被覆



4辺をテープで固定

- なお上記の使い方以外に、患部に薬を直接塗布し、その上をガーゼ等で保護する方法もあります。

裏面に続く

ガーゼ等の交換

- 1 ガーゼ等をぬるま湯でぬらしながら、
ゆっくりと1枚ずつ剥がします。

※ 最後の1枚を剥がす前に、もう一度よくぬらしてください。

患部を刺激することにより、潰瘍部位の血管が損傷し、出血を招くことがあるので、薬の塗布部位は十分にぬらし、乾燥に注意してください。



- 2 流水と泡立てた弱酸性せっけんで丁寧に・やさしく
全体を洗浄し、分泌液や壊死組織等を除去します。



- 3 患部をこすらないよう、タオルなどで押さえるように
やさしく水分を取ります。

次のことにご注意ください

- 薬の使用中は飲酒を控えてください。
- 日光や日焼けランプ等、紫外線に当たることを避けてください。
※ 紫外線により薬の効果が減弱することがあります。
- 乳幼児、小児の手の届かないところで保管してください。
- 直射日光や凍結（0度以下）を避け、室温で保管してください。

次の場合には、医師・薬剤師・看護師に相談してください

- 浸出液が多く、1日3回以上吸水パッドの交換が必要な場合
- 圧迫して止血しても5分以上出血がある場合
- テープでかぶれた場合
- 皮膚の痛みや刺激感を伴う皮膚症状など異常を感じた場合
- 他の医療機関で処方されたお薬がある場合
- 味覚異常がある場合
- 手足のしびれや感覚鈍麻がある場合

これら以外でも気になる症状がある場合には相談してください。

病院・医院名