

4987211 031183

使用に際してこの説明文をよくお読み下さい。

【使用上の注意】**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】過酸化水素2.5～3.5w/v%
添加物としてフェナセチンを含有。

【効能・効果】傷の消毒・洗浄

日本薬局方

オキシドール**第3類医薬品**

100mL

発売元

Ⓡ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

キャップ：PP
ボトル：PE

【用法・用量】そのままの液又は2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること。
- (3) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 日に入らないよう注意すること。万一、日に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には直ちに眼科医の診療を受けること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあけること。

【お問合せ先】丸石製薬株式会社 TEL.0120-014-561

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限