

2015年2月改訂(第5版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16000AMZ04071
製価 収載	1985年8月
販売開始	1993年9月

貯法:室温保存

使用期限:3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度又は広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【組成・性状】

1.組成

100g中 酸化亜鉛 10g
及び添加物としてミツロウ、ダイズ油、ジブチルヒドロキシトルエン 含有。

2.性状

淡黄色の軟膏で、わずかに特異なにおいがある。

【効能・効果】

- 下記皮膚疾患の收れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門瘙痒症、白癬、面皰、瘡、よう
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

収斂・消炎・保護剤

亜鉛華(10%)単軟膏

「ニッコー」

500g



【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1~数回、患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

頻度不明
過敏症
皮膚

このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.使用上の注意

眼には使用しないこと。

製造番号

使用期限

<調剤包装単位用コード>



(01)04987211200329

<販売包装単位用コード>



(01)1498721100329

2008年7月改訂(第4版)	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16000AMZ04071
薬価収載	1985年8月
販売開始	1993年9月

貯法: 室温保存

使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

重度または広範囲の熱傷[酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。]

【組成・性状】

1.組成

100g中 酸化亜鉛 10g
及び添加物としてミツロウ、ダイズ油、
ジブチルヒドロキシトルエン 含有。

2.性状

淡黄色の軟膏で、わずかに特異なにおいがある。

【効能・効果】

- 下記皮膚疾患の收れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門瘙痒症、
白癬、面皰、癧、よう
- その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

収斂・消炎・保護剤

亞鉛華(10%)単軟膏

「ニッコー」

500g

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1~数回、患部に塗擦または貼布する。

【使用上の注意】

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症	過敏症状
皮膚	発疹、刺激感等

このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。

2.使用上の注意

眼には使用しないこと。

製造番号

使用期限

GS1-RSS

(01)1498721100329

JAN

498721100322