

マスクン スクラブ4%

マスクン® スクラブ4%

【薬効薬理】

マスクンスクラブの殺菌作用

本剤の *in vitro* の試験における殺菌時間は、グラム陽性菌2株、グラム陰性菌12株をすべて30秒以内に殺菌し、真菌1株も120秒以内に殺菌した。

〈調節剤包装単位用コード〉
COT104987211680039

〈販売包装単位用コード〉
COT114987211580039

使用後、フィルムをはがしてキャップをはずした後、空容器を図のようにして折り目を外側に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません。)



キャップ: PP
ボトル: PE
ラベル: PET

開封日 年 月 日

手指用殺菌消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)

マスクン® スクラブ4%

MASKIN®SCRUB 4%

500mL

- 注意
1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。

製造番号

使用期限

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

マスクン スクラブ4%

マスクン® スクラブ4%

2014年11月改訂(第2版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01493
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2009年8月
再評価結果	1992年6月

貯 法: 密栓し、遮光して室温保存すること。
使用期限: 3年(表示の使用期限を参照すること。)
注 意: 取扱以上の注意の項参照

【禁忌(次の場合には使用しないこと)】
クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者

【組成・性状】

1. 組成 100mL中
クロルヘキシジングルコン酸塩 4g(4%w/v)
及び添加物としてマクロゴール400、
赤色102号、pH調整剤、その他6成分 含有。
2. 性状 赤色澄明な粘濁性の液で、わずかに特異なにおいがある。
pH: 5.5~7.0
比重d₂₀: 1.030~1.050

【効能・効果】

医療施設における医師、看護婦等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

1. 術前、術後の術者の手指消毒の場合
手指及び前腕部を水でぬらし、本剤約5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流し、更に本剤約5mLで2分間洗浄をくりかえし、同様に洗い流す。
2. 1. 以外の医療従事者の手指消毒の場合
手指を水でぬらし、本剤約2.5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流す。

マスクン® スクラブ4%

【使用上の注意】

1. 慎重投与(次の場合には慎重に使用すること)
薬物過敏体質の者
2. 重要な基本的注意
(1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
(2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
(3) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちに水で洗い流すこと。
3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
(1) 重大な副作用
ショック(0.1%未満)があらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
(2) その他の副作用
過敏症: 発疹等(0.1~5%未満)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
4. 適用上の注意
投与経路: 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
5. その他の注意
クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

1. 本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
2. 安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験(40℃、75%R.H. 6ヵ月)の結果、マスクンスクラブ4%は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

マスキン スクラブ4%

マスキン® スクラブ4%

【薬効薬理】

マスキンスクラブの殺菌作用

本剤の *in vitro* の試験における殺菌時間は、グラム陽性菌2株、グラム陰性菌12株をすべて30秒以内に殺菌し、真菌1株も120秒以内に殺菌した。

JAN



4

GS1-RSS




(01) 14987211580039



キャップ：PP
ボトル：PE
ラベル：PET

使用后、フィルムをはがしてキャップをはずした後、空容器を図のようにして折り目を外側に押しつぶして下さい。
(つぶした後は元に戻りません。)



手指用殺菌消毒剤
(クロルヘキシジン製剤)

マスキン® スクラブ4%

MASKIN®SCRUB 4%

500mL

- 注意
1. 手指消毒以外の目的には使用しないこと。
 2. 本剤は希釈せずに原液のまま使用すること。

製造番号

使用期限

製造販売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津2-4-2

マスキン スクラブ4%

マスキン® スクラブ4%

【使用上の注意】

1. 慎重投与 (次の場合には慎重に使用すること)
薬物過敏体質の者
2. 重要な基本的注意
 - (1) ショック等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。
 - (2) 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。
 - (3) 本剤が眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。
3. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
 - (1) 重大な副作用
ショック (0.1%未満) があらわれることがあるので観察を十分に行い、悪心・不快感・冷汗・眩暈・胸内苦悶・呼吸困難・発赤等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
 - (2) その他の副作用
過敏症：発疹等 (0.1～5%未満) があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。
4. 適用上の注意
投与経路：手指消毒以外の目的には使用しないこと。
5. その他の注意
クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与により、ショック症状を起こした患者のうち、数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

【取扱い上の注意】

1. 本剤の付着した白布を直接、次亜塩素酸塩で漂白すると、褐色のシミを生じることがあるので、漂白剤としては過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。
2. 安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験 (40℃、75%RH、6ヵ月) の結果、マスキンスクラブ4%は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。

マスキン® スクラブ4%

2009年7月作成 (第1版)	
日本標準商品分類番号	872619
承認番号	22100AMX01493
薬価収載	薬価基準対象外
販売開始	2009年8月
再評価結果	1992年6月

貯 法：密栓し、避光して室温保存すること。

使用期限：3年 (表示の使用期限を参照すること。)

注 意：取扱い上の注意の項参照

【禁忌 (次の場合には使用しないこと)】

クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者

【組成・性状】

1. 組成
100mL中
クロルヘキシジングルコン酸塩 4g (4% (w/v))
及び添加物としてマクロゴール400、
赤色102号、pH調整剤、その他6成分 含有。
2. 性状
赤色澄明な粘稠性の液で、わずかに特異なにおいがある。
pH：5.5～7.0
比重0.999：1.030～1.050

【効能・効果】

医療施設における医師、看護婦等の医療従事者の手指消毒

【用法・用量】

1. 術前、術後の術者の手指消毒の場合
手指及び前腕部を水でぬらし、本剤約5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流し、更に本剤約5mLで2分間洗浄をくりかえし、同様に洗い流す。
2. 1. 以外の医療従事者の手指消毒の場合
手指を水でぬらし、本剤約2.5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流す。