

レボプピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

250mg/100mL(0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

POPSCAINE® 0.25% inj. bag 250mg/100mL

100mL×1バッグ

注意一医師等の処方箋により使用すること

【組成】 1mL中 レボプピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボプピバカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】 術後鎮痛

【貯法】 室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

本剤は硬膜外腔に投与すること

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

禁 静 注

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

B-1
NP-0A-017



丸石製薬株式会社

製造販売元

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

【貯法】 室温保存

【効能・効果】 術後鎮痛

(レボプピバカインとして2.5mg)含有

【組成】 1mL中 レボプピバカイン塩酸塩2.82mg

注意一医師等の処方箋により使用すること

100mL×1バッグ

POPSCAINE® 0.25% inj. bag 250mg/100mL

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

250mg/100mL(0.25%)

レボプピバカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

禁 静 注



製造番号

使用期限

禁 静 注

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

目を押し破って下さない。
紙を廃棄するときはミシンとを押し破って下さい。

開封口

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

禁 静 注

①
②
③
④

レボブピカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

250mg / 100mL (0.25%)

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

POPSCAINE® 0.25% inj. bag 250mg / 100mL

100mL×1バッグ

注意—医師等の処方箋により使用すること

【組成】 1mL中 レボブピカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピカインとして2.5mg)含有

【効能・効果】 術後鎮痛

【貯法】 室温保存

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

禁 静 注

本剤は硬膜外腔に投与すること

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

禁 静 注

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

A-1
NP-0A-017



0701

丸石製薬株式会社

製造販売元

用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

【貯法】 室温保存

【効能・効果】 術後鎮痛

(レボブピカインとして2.5mg)含有

【組成】 1mL中 レボブピカイン塩酸塩2.82mg

注意—医師等の処方箋により使用すること

100mL×1バッグ

POPSCAINE® 0.25% inj. bag 250mg / 100mL

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

250mg / 100mL (0.25%)

レボブピカイン塩酸塩注射剤
長時間作用性局所麻酔剤

禁 静 注

開封口

禁 静 注

本剤は硬膜外腔に投与すること

注意

本剤の投与により万一ショック様症状が
起こった場合は、直ちに人工呼吸、酸素
吸入を実施すること。

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

禁 静 注

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

開封する
際はミシン
針を押し破っ
て下さい。

劇 ポプスカイン® 0.25%注バッグ 250mg/100mL

禁 静 注

GSI



使用期限

JAN



製造番号

4 987211752224

①②③④

250mg/100mL (0.25%)

禁 静 注

本剤は硬膜外腔
に投与すること



バッグ：PE,
 ：ゴム
シール：PET

75

50

劇 ポプスカイン0.25%注バッグ
250mg/100mL

注意—医師等の処方箋により使用すること

【成分】1mL中 レボブピバカイン塩酸塩2.82mg
(レボブピバカインとして2.5mg)含有

25
APPROX
D-1

【効能・効果】術後鎮痛

【貯法】室温保存


用法・用量等詳細は添付文書をご参照願います。

製造販売元

Ⓜ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

100mL



劇ポプスカイン0.25%注
バッグ250mg/100mL



(01)04987211852221

製造番号

使用期限

C-2