

20mL×10管

薄点
めて滴
専用



丸石製薬株式会社



【組成】 1管(20mL中) 塩化カリウム 3g
 (15w/v%、2モル液)

【用法】 遮光し、室温保存。
 本剤を希釈剤で薄めたとき、均一な希釈状態を確認できるまで、均一に振り混ぜる。黄色～黄褐色の液としている。

【注意】 詳細は添付文書をご参照下さい。
 注意—医師等の処方箋により使用すること
 効能・効果、用法・用量、使用上の注意等

カリウム補給剤
(塩化カリウム製剤)



K.C.L.[®]点滴液 15%

(15w/v%, 2モル液)

K.C.L. DRIP INJECTION 15%

必ずカリウムとして40mEq/L以下の濃度(1アンプル(20mL)を1L以上)に薄めてご使用下さい。

OPEN

ケースから取り出して医療現場へ持ち出す場合には、添付の遮光ポリ袋をご使用下さい。

20mL×10管

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

薄点
めて滴
専用

必ず1アンプル(20mL)を1L以上に薄めてご使用ください



品名	K.C.L. 点滴液15%
製造番号	
使用期限	



20mL×10管

こちらを底面にして保管願います。

20mL×10管



カラス：アソシエイト



薄めて点滴専用

【組成】 K.C.L. 点滴液15% (15w/v%、2モル液) 1管(20mL中) 塩化カリウム 3g

【用法】 遮光し、室温保存。

【注意】 本剤を希釈剤で薄めたとき、均一な希釈状態を確認できるよう、ウリホフラビンジリン酸エタナールナトリウムを配合し、黄色～だいだい黄色の液としている。

【貯法】 遮光し、室温保存。

【注意】 本剤を希釈剤で薄めたとき、均一な希釈状態を確認できるよう、ウリホフラビンジリン酸エタナールナトリウムを配合し、黄色～だいだい黄色の液としている。

【用法】 遮光し、室温保存。

【注意】 本剤を希釈剤で薄めたとき、均一な希釈状態を確認できるよう、ウリホフラビンジリン酸エタナールナトリウムを配合し、黄色～だいだい黄色の液としている。

【組成】 K.C.L. 点滴液15% (15w/v%、2モル液) 1管(20mL中) 塩化カリウム 3g

【用法】 遮光し、室温保存。

【注意】 本剤を希釈剤で薄めたとき、均一な希釈状態を確認できるよう、ウリホフラビンジリン酸エタナールナトリウムを配合し、黄色～だいだい黄色の液としている。

カリウム補給剤
(塩化カリウム製剤)



K.C.L.® 点滴液 15%

(15w/v%, 2モル液)

K.C.L. DRIP INJECTION 15%

薄めて点滴専用

必ずカリウムとして40mEq/L以下の濃度(1アンプル(20mL)を1L以上)に薄めてご使用下さい。

OPEN

ケースから取り出して医療現場へ持ち出す場合には、添付の遮光ポリ袋をご使用下さい。

20mL×10管

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

薄めて点滴専用

必ず1アンプル(20mL)を1L以上に薄めてご使用ください

GS1-RSS



(01)14987211305526



品名	K.C.L. 点滴液15%
製造番号	
使用期限	

JAN



4 987211 305529

20mL×10管

こちらを底面にして保管願います。

点 滴 専 用
薄 め て 点 滴



点 滴 専 用
薄 め て 点 滴

K.C.L.点滴液15%

K.C.L.[®]点滴液 15%

【組成】:1管(20mL中)

塩化カリウム3g(15w/v%,2モル液)

[カリウム(K)量:40mEq]

20mL

**必ず1アンプルを1L以上
に薄めてご使用下さい。**

製造番号

使用期限

注意—医師等の処方せんにより
使用すること

【貯法】

遮光し、室温保存

製造販売元

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

点滴専用 薄めて点滴

