開封日　　年　　月　　日

イソプロパノール含有製剤

手術用乾燥性殺菌消毒剤
（ヨードホール製剤）

プレポダイン®
フィールド 1％

PREPODYNE® field 1％

【組　成】
100mL中 有効ヨウ素……1g

注　意：直射日光を避けて保存。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

500mL

製造販売元
㊞ 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

プレポダイン®
フィールド 1％

本剤はイソプロパノールを含有するので、**特に**次のことに注意すること。
- **損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと。**
- 本剤は引火性、爆発性があるため、**火気（電気メス使用等も含む）**には十分注意すること。
- **電気メスによる発火事故が報告されている**ので、電気メス等を使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

プレポダイン／PREPODYNEは
ペネトーン コーポレーションの登録商標です。

プラ
キャップ：PP
ボトル：PE
袋　：PE

＜調剤包装単位用コード＞
(01)04987211670238

＜販売包装単位用コード＞
(01)14987211570238

製造番号

使用期限

イソプロパノール含有製剤

手術用乾燥性殺菌消毒剤
（ヨードホール製剤）

プレポダイン®
フィールド 1%
PREPODYNE® field 1%

500mL

【組　成】
100mL中 有効ヨウ素……1g
含有。

注　意：直射日光を避けて保存。

製造番号

使用期限

製造販売元
丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

本剤はイソプロパノールを含有するので、特に次のことに注意すること。
- **損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと。**
- 本剤は引火性、爆発性があるため、**火気（電気メス使用等も含む）**には十分注意すること。
- **電気メスによる発火事故が報告されている**ので、電気メス等を使用する場合には、本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご参照願います。

GS1-RSS
(01)14987211570238

プラ
キャップ:PP
ボトル:PE
袋　:PE

JAN
4 987211 570231

プレポダイン/PREPODYNEは
ペネトーン コーポレーションの登録商標です。