

MARUISHI

40mg  
40mg/2ml

筋弛緩剤  
毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

2mL×10管



禁・凍結  
~5°

筋弛緩剤

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

2mL×10管

日本薬局方

毒 スキサメトニウム塩化物注射液

差込口

2mL×10管

筋弛緩剤

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

禁・凍結  
~5°



40mg  
40mg/2ml

40mg

筋弛緩剤

2mL×10管

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

40mg

40mg/2ml



販売包装単位用コード

使用期限

製造番号

工場用コード



0343

A-3



禁・凍結  
~5°

このケースは、再生紙を使用しております。

箱  
紙  
トイ  
ガラス：75%以上

40mg  
40mg/2ml

Suxamethonium Inj. 40 "Maruishi"

毒 スキサメトニウム塩化物注射液

日本薬局方

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

筋弛緩剤

2mL×10管

箱を廃棄するとき、箱の両側のミシン目を押し破ってください。

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪府鶴見区今津中2-4-2

●組成 1管(2mL)中 スキサメトニウム塩化物水和物44mg (脱水物として40mg)含有  
●貯法 凍結を避け、5℃以下で保存  
注意一医師等の処方箋により使用すること  
効能・効果、用法・用量、使用上の注意等詳細は添付文書をご覧ください。  
注意：本剤の使用に当たっては必ずガス麻酔器又は人工呼吸器を準備すること



40mg  
40mg/2ml

40mg

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

2mL×10管

MARUISHI

筋弛緩剤

2mL×10管

毒 スキサメトニウム注40「マルイシ」

日本薬局方

毒 スキサメトニウム塩化物注射液

Suxamethonium Inj. 40 "Maruishi"

40mg

40mg/2mL

開封口

注意：  
本剤の使用に当たっては必ずガス麻酔器又は人工呼吸器を準備すること

禁・凍結  
~5°

製造販売元  
丸石製薬株式会社  
大阪府鶴見区今津中2-4-2

