

Where do you use it?

どちらで手指消毒剤をお使いになりますか？



手術室

手術時手指消毒



一般病棟・外来（目に見える汚れがない場合）

・患者に触れる前後 ・血液や体液、粘膜、排泄物、創傷部との接触後
・清潔/無菌操作の前 ・患者周辺の物品に触れた後 ・手袋を外した後



一般病棟・外来

標準予防策の手袋を外した後



液 剤

粘性ローション剤

液 剤

フォーム剤

ゲル剤

液 剤

有効成分

エタノール濃度
(添加物として)危険物の種類
危険物等級

クロルヘキシジングルコン酸塩
1.0 (w/v)% 0.5 (w/v)%

エタノール約80 (v/v)%

第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

ベンザルコニウム
塩化物0.2 (w/v)%

エタノール約80 (v/v)%

第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

クロルヘキシジン
グルコン酸塩
0.2 (w/v)%

エタノール約80 (v/v)%

第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

ベンザルコニウム塩化物0.2 (w/v)%

約64vol% (約56w/w%) ノンアルコール

該当しない

エタノール約80 (v/v)%

第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

エタノール約80 (v/v)%

第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ

製品名

規制区分

有効性評価

添加物

包装

写真

ウエルアップ[®]
ハンドローション1%

医療用医薬品
(薬価基準未収載)

ASTM (US-TFM) E1115

グリセリン、グリチルリチン酸二カリウム、中鎖脂肪酸トリグリセリド、エタノール、pH調整剤

1L、500mL



ウエルアップ[®]
ハンドローション0.5%

医療用医薬品
(薬価基準未収載)

ASTM (US-TFM) E1115

疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、1、3-ブチレングリコール、グリチルリチン酸、アジピン酸ジイソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、エタノール、pH調整剤

1L、500mL



ウエルパス[®]
手指消毒液0.2%

医療用医薬品
(薬価基準対象外)

ASTM (US-TFM) E1174

プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、エタノール、その他4成分

5L、1L、500mL、300mL、100mL×10



ウエルフォーム[®]

第2類医薬品

ASTM E2755-15

ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリチルリチン酸、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、トコフェロール酢酸エステル、エタノール

1L、360mL、180mL、80mL×10



ウエルパス[®]フォーム

第3類医薬品

ASTM E2755-15

ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリセリン、プロピレングリコール、グリチルリチン酸二カリウム、エトナトリウム水和物、エタノール

180mL、360mL



ウエルパス[®]フォーム
ZERO

第3類医薬品

ASTM E2755-15

フェノキシエタノール、d-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、グリチルリチン酸二カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル

180mL



ウエルリード[®]

指定医薬部外品

ASTM E2755-15

濃グリセリン、キシリトール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、グリチルリチン酸二カリウム、カルボキシビニルポリマー及びpH調整剤

250mL、90mL×10



ウエルセプト[®]

第3類医薬品

ASTM (US-TFM) E1174、ASTM E1838-10

乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、トコフェロール酢酸エステル、ハアセチル化しよ糖

500mL、300mL、100mL×10



医療用医薬品

一般用医薬品

指定医薬部外品

一般用医薬品

ウエルアップ® ハンドローション0.5%
Wellup® Hand Lotion 0.5%
ウエルアップ® ハンドローション1%
Wellup® Hand Lotion 1%
® 登録商標

0.5%・1%：2024年3月改訂（第1版）

	ウエルアップ® ハンドローション0.5%	ウエルアップ® ハンドローション1%
日本標準商品分類番号	872619	872619
承認番号	21900AMX00314	22200AMX00910
販売開始	2007年4月	2011年1月

貯 法：室温保存
有効期間：3年

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

ウエルアップ®ハンドローション0.5%
2.1 クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者 [8, 参照] 2.2 腔、膀胱、口腔等の粘膜面には使用しないこと [クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。] 2.3 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと [刺激作用を有する。]
ウエルアップ®ハンドローション1%
2.1 クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者 [8, 参照] 2.2 脳、脊髄、耳（内耳、中耳、外耳）には使用しないこと [聴神経及び中枢神経に対して直接使用した場合は、難聴、神経障害を来すことがある。] 2.3 腔、膀胱、口腔等の粘膜面には使用しないこと [クロルヘキシジン製剤の左記部位への使用により、ショック、アナフィラキシーの症状の発現が報告されている。] [14.2.2 参照] 2.4 損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと [刺激作用を有する。] 2.5 眼には使用しないこと [角膜障害等の眼障害を来すおそれがある。] [14.2.3 参照]

3. 組成・性状
3.1 組成

販売名	ウエルアップ®ハンドローション0.5%
有効成分	100mL 中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 2.5mL (クロルヘキシジングルコン酸塩として 0.5g)
添加剤	疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、1, 3 - プチレングリコール、グリチルレチン酸、アジピン酸ジイソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、エタノール、pH 調節剤
販売名	ウエルアップ®ハンドローション1%
有効成分	100mL 中 日局クロルヘキシジングルコン酸塩液 5mL (クロルヘキシジングルコン酸塩として 1.0g)
添加剤	濃グリセリン、グリチルリチン酸二カリウム、中鎖脂肪酸トリグリセリド、エタノール、pH 調節剤

3.2 製剤の性状

販売名	ウエルアップ®ハンドローション0.5%
性状	無色澄明の粘稠性のある液で、特異なおおいを有する。
販売名	ウエルアップ®ハンドローション1%
性状	無色澄明の液で、特異なおおいがある。

4. 効能又は効果

ウエルアップ®ハンドローション0.5%
手指の消毒
ウエルアップ®ハンドローション1%
手指・皮膚の消毒

6. 用法及び用量

ウエルアップ®ハンドローション0.5%
本剤をそのまま用いる。
ウエルアップ®ハンドローション1%
手指・皮膚の消毒には、洗浄後、1 回数回量を塗布する。

8. 重要な基本的注意

ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。[2.1、9.1.1、11.1.1 参照]

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 薬物過敏症の既往歴のある者（クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者を除く）

[8, 参照]

9.1.2 喘息等のアレルギー疾患の既往歴、家族歴のある者

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

●詳細は電子添文等をご参照ください。電子添文等の改訂にご留意ください。

2025 年 1 月改訂

専用アプリ「添文ナビ」でGS1 バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等を閲覧できます。

0.5%  1% 
(01)14987211560574 (01)14987211560598

製造販売元

技術提携

 丸石製薬株式会社
大阪市鶴見区今津中2-4-2

〔製品情報お問い合わせ先〕
学術情報部 TEL：0120-014-561
〔販売情報提供活動にご意見〕
kantokubumon@maruishi-pharm.co.jp



吉田製薬株式会社

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック（0.1%未満）、アナフィラキシー（頻度不明）

血圧低下、じん麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。[8, 参照]

11.2 その他の副作用

	0.1% 未満	頻度不明
過敏症	発疹、じん麻疹	
皮膚		刺激症状

14. 適用上の注意

14.1 薬剤使用前の注意

14.1.1 血清・膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

14.1.2 石鹸類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石鹸分を十分に洗い落としてから使用すること。

14.2 薬剤使用時の注意

ウエルアップ®ハンドローション0.5%
14.2.1 手指消毒以外の目的には使用しないこと。 14.2.2 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。 14.2.3 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。 14.2.4 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。 14.2.5 反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。 14.2.6 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。

ウエルアップ®ハンドローション1%
14.2.1 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。 14.2.2 産婦人科用（腔・外陰部の消毒等）、泌尿器科用（膀胱・外性器の消毒等）には使用しないこと。[2.3 参照] 14.2.3 眼に入らないように注意すること。眼に入った場合は直ちによく水洗すること。[2.5 参照] 14.2.4 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。 14.2.5 エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 14.2.6 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。 14.2.7 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。 14.2.8 電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。電気メスによる発火事故が報告されている。

14.3 薬剤使用後の注意

本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の使用によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異的なIgE抗体が検出されたとの報告がある。

20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22. 包装

ウエルアップ®ハンドローション0.5%
500mL [ポリ容器]、1L [ポリ容器]
ウエルアップ®ハンドローション1%
500mL [ポリ容器]、1L [ポリ容器]

25. 保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

火気厳禁

第4類
アルコール類(エタノール)
危険等級Ⅱ
水溶性

ウエルパス® 手指消毒液0.2%

WELPAS® Antiseptic Solution for Hand 0.2%

®登録商標

2024年2月改訂(第1版)

日本標準商品分類番号 872619

承認番号 22100AMX01378

販売開始 1985年6月

貯 法：室温保存

有効期間：3年

2.禁忌(次の場合には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと[刺激作用を有する。]

3.組成・性状

3.1 組成

販 売 名	ウエルパス手指消毒液0.2%
有効成分	100mL中 日局濃ベンザルコニウム塩化物液50 0.38g (ベンザルコニウム塩化物として0.2g)
添 加 剤	プロピレングリコール、ミリスチン酸 イソプロピル、エタノール、その他4成分

3.2 製剤の性状

販 売 名	ウエルパス手指消毒液0.2%
性 状	無色澄明の液で、特異なにおいがある。

4.効能又は効果

医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

6.用法及び用量

〈医療従事者の通常の手指消毒の場合〉

本剤約3mLを1回手掌にとり、乾燥するまで摩擦する。ただし、血清、膿汁等の有機物が付着している場合は、十分に洗い落した後、本剤による消毒を行う。

〈術前・術後の術者の手指消毒の場合〉

手指及び前腕部を石けんで十分洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、本剤約3mLを手掌にとり、乾燥するまで摩擦し、更にこの本剤による消毒を2回繰り返す。

11.副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	紅斑、そう痒感、浮腫等
皮 膚	刺激症状

14.適用上の注意

14.1 薬剤使用時の注意

14.1.1 手指消毒以外の目的には使用しないこと。

14.1.2 本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。

14.1.3 眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

14.1.4 反復使用した場合には脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。

14.1.5 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

14.1.6 石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、予備洗浄に用いた石けん分を十分に洗い落としてから使用すること。

14.1.7 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気には十分注意すること。

14.1.8 本剤で消毒した手指で2.5kg以下の低出生体重児を取扱う場合、低出生体重児の皮膚がかぶれることがあるので十分注意すること。

20.取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

22.包装

100mL×10本[ポリ容器]、300mL[ポリ容器]、
500mL[ポリ容器]、1L[ポリ容器]、5L[ポリ容器]

25.保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない(薬価基準未収載)。

火気厳禁

第4類

アルコール類(エタノール)

危険等級Ⅱ

水溶性

第2類医薬品 泡の速乾性手指消毒剤

販売開始	80mL×10:2016年6月 180mL:2012年10月 360mL・1L(手動用・電動用):2011年6月
------	--

2017年10月現在

ウエルフォーム®

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品*を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	*80mLはケース
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 効能・効果
手指の消毒

●用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) やけどのような痛みを伴う炎症を起こすことがあるので、溶液の状態で長時間皮膚と接触させないこと。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

●成分・分量

本剤100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩0.2g
及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリチルリチン酸、N-コイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、トコフェロール酢酸エステル、エタノール 含有。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 使用時は、ストッパーを外すこと。(180mL、360mLのみ)
- (8) キャップを取り外してディスペンサーに装着すること。(1L電動・手動ディスペンサー用のみ)

●包装

80mL×10、180mL、360mL
1L(手動・電動ディスペンサー用) (減容容器)

火気厳禁

第4類
アルコール類(エタノール)
危険等級Ⅱ
水溶性



第3類医薬品 泡のアルコール手指消毒剤

販売開始	2023年2月(360mL) 2025年4月(180mL)
------	----------------------------------

2024年12月現在

ウエルパス®フォーム

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 効能・効果
手指の殺菌・消毒

●用法・用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とす後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (6) 手に取った後、塗り広げ、洗い流さないこと。

●成分・分量

本剤100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g
及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリセリン、プロピレングリコール、グリチルリチン酸二カリウム、エドト酸ナトリウム水和物、エタノール 含有

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (7) 使用時は、ストッパーを外すこと。

●包装

180mL、360mL エタノール(約56w/w%)

火気注意



第3類医薬品 泡の手指消毒剤

販売開始	2023年2月
------	---------

2023年6月現在

ウエルパス®フォームZERO

△使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
損傷のある皮膚。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

●効能・効果

手指の殺菌・消毒

●用法・用量

適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とす後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (6) 手に取った後、塗り広げ、洗い流さないこと。

●成分・分量

本剤100mL中 ベンザルコニウム塩化物0.2g
及び添加物としてフェノキシエタノール、dl-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、グリチルリチン酸二カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル 含有

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5) 使用時は、ストッパーを外すこと。

●包装

180mL

第3類医薬品

速乾性擦式手指消毒剤

ウエルセプト®

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品(ケース)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

● 効能・効果

手指・皮膚の殺菌・消毒

● 用法・用量

適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

販売開始	100mL×10：2020年1月 300mL：2013年12月 500mL：2010年3月
------	---

2021年3月現在

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とした後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

● 成分・分量

100mL 中 日局エタノール 83mL
及び添加物として乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、トコフェロール酢酸エステル、ハアセチル化しよ糖 含有。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

● 包装

100mL×10、300mL(減容器、ポンプ添付)、500mL(減容器、ポンプ添付)

火気厳禁

第4類
アルコール類
(エタノール)
危険等級Ⅱ
水溶性

指定医薬部外品

ウエルリード®

販売名：消毒用ハンドジェル× A

△ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 患部が広範囲の人。
(2) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 損傷のある皮膚。
(2) 目の周囲、粘膜等。(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

● 効能・効果

手指・皮膚の洗浄・消毒

● 用法・用量

適量をそのまま手指・皮膚に塗布または塗擦する。

販売開始 2023年2月

2024年10月現在

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 本剤は製品の性質上、ポンプの先の液が固まる場合があります。このような場合にはこの固まりを取り除いてから使用すること。(250mL)

● 成分・分量

エタノール76.9～81.4vol%及び添加物として濃グリセリン、キシリトール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、グリチルリチン酸二カリウム、カルボキシビニルポリマー及びpH調節剤

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。

● 包装

90mL×10、250mL

火気厳禁

第4類
アルコール類
(エタノール)
危険等級Ⅱ
水溶性

各種ツールのご紹介

使用部署、使用目的に応じて各種ツールをご使用下さい。



※スタンドは別途ご用意ください

足踏み式ディスペンサー
500mL 用(角型)



※スタンドは別途ご用意ください

足踏み式ディスペンサー
1L 用(角型)



※スタンドは別途ご用意ください

足踏み式ディスペンサー
ウエルセプト 500mL 用



1L

500mL

ウエルパス手指消毒液0.2% 500mL, 1L 専用
足踏み式ディスペンサー(スタンド型)



デスクトップホルダー
(オーバル・500mL 角型)



デスクトップホルダー
1L 用(角型)



手摺り用ホルダー
(オーバル・500mL 角型)



手摺り用ホルダー
1L 用(角型)



壁用ホルダー
(オーバル・
500mL 角型)



壁用ホルダー
1L 用(角型)



受け皿セット(ホワイト)



ウエルフォーム
電動ディスペンサー用
スタンド



ウエルフォーム専用
電動ディスペンサー
TFII ULTRA(ホワイト)




ウエルフォーム専用
電動ディスペンサー
TFII ULTRA(ブルー)




ウエルフォーム
電動ディスペンサー用
受け皿(白)




ウエルフォーム
手動ディスペンサー(白)



ウエルフォーム
手動ディスペンサー(青)



リールストラップ(丸型)



リールストラップ
(ハート型)



携帯用ポシェット
(ピンク)



携帯用ポシェット
(ネイビー)



携帯用ポシェット
(PVC 紺)

デザインが異なる可能性があります。

ツール適合表

製品名	ウエルアップハンドローション 0.5%、1%	ウエルアップハンドローション 0.5%、1%	ウエルバス手指消毒液 0.2%	ウエルバス手指消毒液 0.2%	ウエルバス手指消毒液 0.2%	ウエルバス手指消毒液 0.2%	ウエルフォーム	ウエルフォーム	ウエルフォーム	ウエルフォーム（手動用）	ウエルフォーム（電動用）	ウエルバスフォーム	ウエルバスフォーム	ウエルバスフォームZERO	ウエルセプト	ウエルセプト	ウエルセプト	ウエルリード	ウエルリード
容 量	500 mL	1 L	100 mL	300 mL	500 mL	1 L	80 mL	180 mL	360 mL	1L	1L	180 mL	360 mL	180 mL	100 mL	300 mL	500 mL	90 mL	250 mL
販促品名																			
足踏み式ディスペンサー 500mL 用（角型）	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
足踏み式ディスペンサー 1L 用（角型）	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
足踏み式ディスペンサー ウエルセプト 500mL 用	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×
ウエルバス手指消毒液0.2% 500mL, 1L 専用 足踏み式ディスペンサー（スタンド型）	▲	▲	×	×	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
デスクトップホルダー（オーバル・500mL角型）	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●
デスクトップホルダー 1L 用（角型）	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
手摺り用ホルダー（オーバル・500mL 角型）	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●
手摺り用ホルダー 1L 用（角型）	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
壁用ホルダー（オーバル・500mL 角型）	●	×	×	●	●	×	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●
壁用ホルダー 1L 用（角型）	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
受け皿セット（ホワイ）	●	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	●	●	●	×	●	●	×	●
リールストラップ（丸型）	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×
リールストラップ（ハート型）	×	×	●	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	●	×
ウエルフォーム 電動ディスペンサー用スタンド	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
ウエルフォーム 専用電動ディスペンサー TF II ULTRA（ホワイ）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
ウエルフォーム 専用電動ディスペンサー TF II ULTRA（ブルー）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
ウエルフォーム 電動ディスペンサー用受け皿（白）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
ウエルフォーム 手動ディスペンサー（白）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ウエルフォーム 手動ディスペンサー（青）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
携帯用ポシェット（ピンク）	×	×	×	●	×	×	×	●	▲	×	×	●	▲	●	×	●	×	×	●
携帯用ポシェット（ネイビー）	×	×	×	●	×	×	×	●	▲	×	×	●	▲	●	×	●	×	×	●
携帯用ポシェット（PVC 紺）	×	×	×	●	×	×	×	●	▲	×	×	●	▲	●	×	●	×	×	●

製造販売元



【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部
大阪市鶴見区今津中2-4-2
TEL. 0120-014-561

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
TEL. 0120-149-931 (フリーダイヤル)