

使用量  
目安

第3類医薬品

開封日 年 月 日  
とりかえ  
の目安 年 月 日



速乾性擦式手指消毒剤

ウエルセプト®

500mL

製造番号

使用期限

飲めません

火気厳禁

製造販売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

残量  
目安

開封日

年

月

日

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。

●使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと  
(1) 損傷のある皮膚。  
(2) 目の周囲、粘膜等。  
(局所刺激作用がある。)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

●効能・効果

手指・皮膚の殺菌・消毒

●用法・用量

適量を消毒部位に塗布又は塗擦する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 血液や汚物が付着している場合には、石けんでよく洗浄し、石けん分を十分洗い落とした後、使用すること。
- (5) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

●成分・分量

100mL中 日局エタノール 83mL  
及び添加物として乳酸、クエン酸水和物、硫酸亜鉛水和物、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、トコフェロール酢酸エステル、ハアセチル化しよ糖 含有。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

火気厳禁

第4類  
アルコール類  
(エタノール)  
危険等級Ⅱ  
水溶性



キャップ: PP  
ボトル: PE  
ラベル: PET A-1

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報部  
大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL. 0120-014-561

